

发烧儿童照料要领

如出现这样的症状，
请再次前往医院受诊



即使是新型流感（甲流），大部分儿童的病状与季节性流感相同，经过3至5天的发烧后自然就会治愈。但是，在少有的情况下会出现急性脑炎、心筋炎、肺炎等的合并症而导致脱水。

因此，在家疗养时请随时随刻注意儿童的状况，避免儿童独处，参考背面记载的病状，定期照料儿童注意健康状态。

请定期确认在家疗养儿童的健康状态。
如有确认儿童出现以下的症状时，请及时前往医疗机构接受诊察。

新型流感（甲流）症状检查点



- 出现手脚抽筋、颤动、翻白眼等痉挛症状。
- 出现发呆两眼无神、对于呼唤没有反应、一直处于昏睡状态等意识障碍症状。
- 出现胡言乱语、语无伦次、奔跑等有异于以往的言行举动。



- 气色不佳（土色、苍白）。嘴唇为紫色（发绀）。
- 呼吸急促（1分60次以上）、呼吸困难。
- 出现气喘、用肩膀以及全身呼吸等症状。
- 诉说“呼吸困难”、“胸闷”。



- 无法吸收水分，半日以上都没有排尿。
- 频繁出现呕吐以及腹泻症状。
- 没有精神、十分疲乏。

※除了已列举的症状以外，出现与以往不同的症状时，
请前往经常就诊的医院与主治医生商榷。

只需要注意以上注意事项，在家庭内对新型流感（甲流）不需要做任何特殊的对应。
只要注意防止流感的传播，请与往常一样在家庭内照料生病的儿童。

想要得知更详细的情报，请参看网站。

厚生劳动省（厚生労働省）

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html> (仅限日语)

日本小儿科学会（日本小児科学会）

<http://www.jpeds.or.jp/influenza-j.html> (仅限日语)